Prospectus de souscription.

Faunula Molluscorum extramarinorum Regionis Palæarcticæ.

Depuis l'achèvement de ma Fauna der Binnenconchylien (1890), un si grand nombre de nouvelles espèces a été decrit (il y en a déja plus de 800), qu'un nouveau Supplément est devenu nécessaire. Mais, de divers côtés et notamment des pays latins, je reçois le conseil pressant de publier un Aperçu des Mollusques extramarines du système européen, avec diagnoses latines, courtes mais précises, et en outre si compact que, bien qu'il doive être plus complet (avec les nouvelles additions) et suffusant pour la détermination sûre de chaque forme, le prix n'en sera que le tiers ou le quart de celui de la grande Faune. La publication d'un tel ouvrage me sourira d'autant mieux que je trouverai l'occasion d'y introduire les réformes résultant de mes recherches continuelles et des autres auteurs pendant ces dix dernières années.

Si donc un nombre de souscripteurs suffisant pour couvrir les frais d'impression s'adresse à moi dans un délai rapproché, le premier fascicule de cette Faunule sera mis aussitôt sous presse. L'ouvrage sera publié par livraisons, dont la première contiendra les sousfamilles Pupinæ et Stenogyrinæ de la famille des Helicidæ.

Chaque livraison aura sa table avec les synonymies respectives. Ce prospectus peut servir à donner une idée du format, de l'impression et de la méthode.

Gen. **Vitrea** Fitz.

A. *Anomphala W. T. imperforata.*
   † Margo colum. superne stricte in locum umbil. concaviusculum productus. (1).
   †† Margo colum. non in locum umbil. productus. (2).

B. *Crystallus Lowe. T. anguste umbilicata; anfr. lente accrescentes; apert. verticalis, anguste lunata.*
  † Umbil. angustus, tantummodo ad apert. paullisper dilatatus.
    **) Anf. ult distincte penultimo latior.*
      a. — Umbil. minutiss., punctif.
        α) Apert. margine superiore non producto. (3).
        β) — — — valde producto. (4).
      b. — Umbil. angustus, sed distinctus, subcylindricus, perspectivus. (5).
      c. — Umbil. apertus, infra distincte dilatatus.
        α) T. parva (diam. 2—3 mm.). (6).
        β) T. minima (dium 1 $^1/_2$*—2 mm).* (7).
    ***) Anfr. ult. penultimo vix latior.* (8).
  †† Umbil. angustus, infundibulif., ad apert. circularis, anfr. omnes præbens. (9).

C. *Hydatina W. T. anguste umbilicata; anfr. celerius accrescentes, ult. multo major; apert. subhorizontalis, late lunaris.*

(1).

V. parthenica B. (1883). T. sat globularis, perconvexa, subtus medio concava, lævis; anfr. 5, sat celeriter accresc., convexi, ult. subrotundus; apert., lunari-rotundata, margine colum. valido. 3 : 2 mm. — *Algeria.*

V. achidoea B. (1883). T. depressior, latior et nitidior, subtus minus concava, anfr. parum convexi, lente accresc., ult. excepto, apert. magis excisa, dilatata, marg. exteriore forte protracto. — *Algeria.*

V. acoena B. (1883). T. supra plana, subtus convexiuscula, medio parum concava, fragillima; anfr. lente accresc., ult. depresso valde dilatato excepto; apert. valde oblongo-dilatata, marg. exteriore parum producto. — *Algeria.*

— — — — — — — — — — — — —

(2).

V. diaphana Stud. sp. (1820). T. subplana; anfr. 5 $^1/_2$—6 $^1/_2$, lente regulariter accresc., vix convexiusculi, ult. penultimo parum latior, rotundatus; apert. anguste lunaris, marg. inferiore substricto, longo, superiore breviss., exteriore forte curvato. 4—4 $^1/_2$: 1 $^3/_5$ mm. (Rm. f. 530, Dup. t. 11 f. 9) — *Eur. media et merid., Algeria.*

V. tarda (B.) Fag. (1888). T. *diaphanæ* similis, sed anfr. superi lente accresc., ult. angustus, subtus inflatus, spira altior, apert. rotundata, marginibus subæqualiter arcuatis. — *Hispania.*

Gen. **Clausilia** Drap.

Subgen. **Siciliaria** Vest.

A. *Lamella infera oblique ascendens.*
  † *Claus. ægre conspicuum, latere sinistro vix repandum.*
    *) *Plicula interposita inconspicua v. deest.* (*1*).
    **) — — *distincta, bene conspicua (ut in omnibus sequentibus).* (*2*).
  †† *Claus. bene conspicuum, latere sinistro valde repandum.* (*3*).
B. *Lam. infera valida, reflexo-horizontalis.* (*4*).

(1).

Cl. crassicostata (Ben.) Pfr. (1856). T. decollata, isabellino-albida, valde costata; plica palat. inf. breviss., acutiss., dorsalis; perist. breviter solutum. 20—23 : 5—5 $^3/_4$ mm. (Rm. f. 1728). — *Sicilia.*

Var. **eminens** A. S. (1868): t. multo densius et argutius costulata.

Cl. leucophryne Pfr. (1862). T. valde decollata, albida, subtiliter ac dense costulata; plica palat. inf. parum conspicua, obliqua, lateralis; perist. magis solutum. 19 – 22 : 5—6 $^1/_2$ mm. (Rm. f. 1729). — *Sicilia.*

Var. **laudabilis** W. (1884): t. isabellina, regulariter striata: 19—20 : 4 $^1/_2$—5 mm.

Cl. nobilis Pfr. (1848). T. parum decollata, albida, punctis strigisque lividis paucis, striata ad lævigata; plica palat. inf. valida, emersa, sublateralis; perist. parum solutum. 24 – 30 : 5 – 6 mm. (Rm. f. 874). — *Sicilia et Favignana.*

(2).

Cl. confinata Ben. (1856). T. decollata, purpurascenti-fusca, confertim et tenue costulata, sutura dense minutim albo-papillata; plica palat. inf. emersa, recta. 15—17 : 4—5 mm. (Rm. f. 1731). — *Ins. Maretimo.*

Var. **merens** mh.: t. fusif., tenue attenuata, plica palat. supera longa, principali validior, infera longa, curvatula: 21—23 : 5 mm. — Palermo.

Var. **commeata** mh.: t. integra, gracilis, costulis superne incrassatulis et albis, plicæ palat. superæ extus in callo crasso infra nodoso sæpe plicifero terminatæ. — Sicil.

(3).

Cl. tiberii Ben. (1856). T. non decollata, corneo-fusca, acute denseque albido-costulata; sutura levis v. subcrenulata; anfr. ult. basi subbicristatus. 21—22 $^1/_2$: 4 $^1/_2$—5 mm. (Rm. f. 1724). — *Sicilia.*

Cl. calcaræ Phil. (1844). T. non decollata, stramineo-cornea, densiss. medio leviss. capillaceo-striatula; sutura marginata, superne minutim strigillato-papillata; anfr. ult. basi subcristatus. 18—21 : 4 $^2/_3$ mm. (Rm. f. 875). — *Sicilia.*

Var. **adelinæ** Ben. (1856): t. obscurior, distinctius costulato-striata, lam. inf. antice nec bifurcata nec nodif. callosa (ut in typo); 19—23 $^1/_2$: 4$^1/_2$ —5 mm. (Rm. f. 1730).

Var. **nodosa** mh.: t. tenue regulariter costulato-striata, perist. expansum, incrassatum, marg. exteriore superne nodoso, plicæ palat. breves, inf. breviss. — Palermo.

(4).

Cl. grohmanniana (Partsch) Rm. (1836). T. decollata, albido-lutescens, acute costulata; sutura levis; plica princip. parum ultra lunellam producta. 21—23 : 5—5 $^1/_2$ mm. (Rm. f. 160). — *Sicilia.* — 1. *minor* A. S., t. pallidior, angustius costulata, sericina; 15—16 : 4—4 $^3/_4$ mm. (Rm. f. 1726).

Cl. septemplicata Phil. (1836). T. raro decollata, brunneo-rufa, densiss. obsolete striatula; sutura papillifera; plica princip. longe ultra lunellam producta. 20 : 5 mm. (Rm. f. 876). — *Sicilia.* — 1. *major*, 22 : 5 mm. — 2. *minor*, 17 : 5 mm.

Var. **prasina** (Ben.) A. S. (1868): t. pallide isabellina, lunella et plicis palat. crassioribus; 18—19 : 4 $^1/_2$—5 mm. (Rm. f. 1727).

Var. **rubra** Ben. (1882): t. rufobrunnea, sæpiss. decollata; 20 : 5 mm.

Cl. brugnoneana Pini (1884). T. non decollata, luteola, densiss. subtiliter striata, superne papillifera; plica princip. longe lunellam transgrediens. 18—20 : 4 mm. (Atti soc. it. 1884 t. 12, f. 16). — *Sicil.*

Lund 1894. Imprimerie Håkan Ohlsson.